

ИНСТРУКЦИЯ № 26/14

по применению дезинфицирующего средства «Лижен-ИП RED»

Инструкция разработана ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

Авторы: Г.Н.Мельникова, Т.Н.Потапова, А.Н.Сукиасян

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «Лижен-ИП RED» представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость оранжево-красного цвета с запахом отдушки и изопропилового спирта. Содержит в качестве действующих веществ: спирт изопропиловый (63,0%), клатрат дидецилдиметиламмоний бромид с мочевиной (0,1%), хлоргексидина биглюконат (0,5%), кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, красители.

Срок годности средства – 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство «Лижен-ИП RED» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза (тестировано на M.terra), грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий), вирусов гепатита В и ВИЧ.

1.3. Средство «Лижен-ИП RED» по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу и введении в желудок согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающее действие на кожу, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает раздражающим действием на глаза. При ингаляционном воздействии средство при соблюдении нормы расхода не вызывает раздражения верхних дыхательных путей и глаз.

ПДК изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м³, 3 класс опасности.

1.4. Средство «Лижен-ИП RED» предназначено для обработки (с окрашиванием) кожи локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей пациентов медицинских организаций. Средство интенсивно окрашивает кожу и четко обозначает границы операционного поля.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА

2.1. Обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров: кожу последовательно двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.2. Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 минута.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Средство «Лижен-ИП RED» использовать только для наружного применения.

4.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

4.3. Хранить отдельно от лекарственных препаратов в недоступном для детей месте.

4.4. Не использовать по истечении срока годности.

4.5. Средство горючее! Хранить вдали от открытого огня. Не обрабатывать средством нагретые поверхности, вблизи открытого огня и включенных приборов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При случайном отравлении через рот обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться за врачебной помощью.

5.2. При случайном попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой в течение 15 мин. При появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА

6.1. Средство транспортируют всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих, воспламеняемых жидкостей, содержащих спирт, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.2. Средство хранить на складе в упаковке производителя-изготовителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей. Температура хранения средства от минус 30 °С до плюс 30 °С. Средство следует хранить отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м) и открытого огня.

6.3. Средство разливают в емкости из полимерных материалов вместимостью от 0,1 до 5,0 дм³. Допускается применение других видов потребительской тары.

6.4. Средство горючее!

6.5. При случайной утечке большого количества средства засыпать его песком или землей (не использовать горючие материалы, например, опилки, стружку), собрать в емкость для последующей утилизации (утилизация – сжигание). При уборке больших количеств средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А» или промышленный противогаз.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или в подземные воды и в канализацию.

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «Лижен-ИП RED»

7.1. Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели качества дезинфицирующего средства «Лижен-ИП RED»

№№ п/п	Наименование показателей	Нормы
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость оранжево - красного цвета
2	Запах	Отдушки и изопропилового спирта
3	Плотность при 20°С, г/см ³	0,871 - 0,883
4	Показатель преломления при 20°С	1,369 - 1,377
5	Массовая доля изопропилового спирта, %	61 - 65
6	Массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромид с мочевиной, %	0,09 - 0,11

